

Estación Agroclimatológica de la Universidad de Talca.
Elaborado por Patricio González Colville (M. Sc.).

Fecha: 31 de mayo 2026.

Boletín Agroclimatológico N° 187



	T° MAXIMA	NORMAL	VARIACION	T° MINIMA	NORMAL	VARIACION	DIAS CON	PLUVIOMETRIA	NORMAL	VARIACION
	MEDIA						HELADAS			
	MENSUAL	° C	° C	MEDIA MENSUAL °C	° C	° C		milímetros	milímetros	milímetros
	°C									
ENERO	32,0	30,9	1,1	14,1	12,1	2,0		0,0	3,8	-3,8
FEBRERO	31,6	29,7	1,9	13,0	11,5	1,5		0,0	5,5	-5,5
MARZO	26,3	27,2	-0,9	10,4	9,7	0,7		73,8	8,7	65,1
ABRIL	21,1	21,8	-0,7	8,1	6,8	1,3		12,2	33,7	-21,5
MAYO	16,4	16,3	0,1	4,3	5,5	-1,2	2	15,3	96,9	-81,6
JUNIO		13,3			5,1				148,8	
JULIO		13,2			3,6				102,7	
AGOSTO		15,6			4,2				80,9	
SEPTIEMBRE		18,4			5,4				45,2	
OCTUBRE		21,8			7,4				27,3	
NOVIEMBRE		25,8			9,2				10,1	
DICIEMBRE		28,8			11,2				6,6	
ANUAL		21,9			7,6				570,1	
NORMAL	1991-2020									

- El total de precipitaciones, al 31 de mayo, 101.3 milímetros. La normal a la fecha es de 148.6 mm. El déficit es de 47.3 mm que equivalen al 31.8%.
- El nuevo promedio normal de lluvias y temperaturas abarca 1991-2020. En Talca la nueva normal anual es de 570.1 milímetros.**
- Condiciones climatológicas de mayo 2026.**
- La temperatura mínima más baja, fue de -1.9° C el día 17 a las 07:00 horas.
- La temperatura máxima más alta: 22.0° C el día 11 a las 15:40 horas.
- La humedad relativa, promedio mensual, fue de 96.1% a las 08:00 hrs. 65.9% a las 14:00 hrs. y 90.7% a las 20:00 hrs.
- La suma total de evaporación del mes alcanzó a 17.2 milímetros de agua, que equivalen a 172.0 metros cúbicos.
- Se registraron 2 heladas: -1.9°C el día 17 y -0.3° C el día 26.
- La suma de horas-frío (base 7.0° C), desde el 1 al 31 de mayo, alcanzo a 224 horas.
- Las horas de sol efectivas fueron, en promedio mensual, de 3.1 horas.
- Según la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos (NOAA), al mes de mayo, las probabilidades de intensidad del evento cálido El Niño, aún son una incertidumbre. Lo más probable es que las temperaturas superficiales del mar, en el área Niño 3.4 de la zona ecuatorial central, alcancen su mayor magnitud entre los meses de primavera-verano

