

Estación Agroclimatológica de la Universidad de Talca.
Elaborado por Patricio González Colville (M. Sc.).

Fecha: 30 de junio 2026.

Boletín Agroclimatológico N° 188

	T° MAXIMA	NORMAL	VARIACION	T° MINIMA	NORMAL	VARIACION	DIAS CON	PLUVIOMETRIA	NORMAL	VARIACION
	MEDIA MENSUAL °C	° C	° C	MEDIA MENSUAL °C	° C	° C	HELADAS	milímetros	milímetros	milímetros
ENERO	32,0	30,9	1,1	14,1	12,1	2,0		0,0	3,8	-3,8
FEBRERO	31,6	29,7	1,9	13,0	11,5	1,5		0,0	5,5	-5,5
MARZO	26,3	27,2	-0,9	10,4	9,7	0,7		73,8	8,7	65,1
ABRIL	21,1	21,8	-0,7	8,1	6,8	1,3		12,2	33,7	-21,5
MAYO	16,4	16,3	0,1	4,3	5,5	-1,2	2	15,3	96,9	-81,6
JUNIO	13,4	13,3	0,1	5,6	5,1	0,5	1	18,3	148,8	-130,5
JULIO		13,2			3,6				102,7	
AGOSTO		15,6			4,2				80,9	
SEPTIEMBRE		18,4			5,4				45,2	
OCTUBRE		21,8			7,4				27,3	
NOVIEMBRE		25,8			9,2				10,1	
DICIEMBRE		28,8			11,2				6,6	
ANUAL		21,9			7,6				570,1	
NORMAL	1991-2020									

- El total de precipitaciones, al 30 de junio, 119.6 milímetros. La normal a la fecha es de 297.4 mm. El déficit es de 177.8 mm que equivalen al 59.8%.
- **El nuevo promedio normal de lluvias y temperaturas abarca 1991-2020. En Talca la nueva normal anual es de 570.1 milímetros.**
- **Condiciones climatológicas de junio 2026.**
- La temperatura mínima más baja, fue de -1.4° C el día 30 a las 03:35 horas.
- La temperatura máxima más alta: 19.2° C el día 18 a las 14:45 horas.
- La humedad relativa, promedio mensual, fue de 96.9% a las 08:00 hrs. 77.8% a las 14:00 hrs. y 89.8% a las 20:00 hrs.
- La suma total de evaporación del mes alcanzó a 7.0 milímetros de agua, que equivalen a 70 metros cúbicos.
- Se registro 1 heladas el día 30 y fue de -1.4° C.
- La suma de horas-frío (base 7.0° C), desde el 1 de mayo al 30 de junio, alcanza a 448 horas.
- Las horas de sol efectivas fueron, en promedio mensual, de 1.8 horas.
- Según la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos (NOAA), el evento cálido El Niño registra un 99.9% de probabilidad que continúe con su ascenso térmico en el océano Pacífico ecuatorial central (área 3.4). Inclusive hasta el verano de 2027. Lo anterior abre las posibilidades para lluvias intensas en corto plazo, como las que ya se están registrando en la zona sur de Chile y que también afectaran a la región del Maule. Durante julio y agosto aumentan las probabilidades de sistemas frontales asociados a ríos atmosféricos y con ello el riesgo de inundaciones y otras afectaciones tanto urbanas como rurales.




Figura 7. Probabilidades oficiales de ENSO para el índice de temperatura relativa de la superficie del mar en la región Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°O-120°O) menos el promedio tropical (20°N-20°S). Índice relativo es reajustado para igualar la varianza del índice tradicional. Figura actualizada el 11 de junio de 2026. Imagen/tabla de alta resolución: